

Länga D

Namn	Beskrivning	Näring och vatten	Beskärning
Ask	Stort ädellövträd. Det senaste trädet som slår ut och det första att blixtnabbt fälla sina löv på hösten. De fallna bladen försvinner mycket fort och lämnar bara nerver och bladskafv kvar. De svarta knopparna liknar klövar, fröställningarna täta kvastar. Kan bli 30 m och 500 år.	Inte aktuellt. Befintlig ask klarar sig själv.	Ask kan beskäras under juli till hösten, förutsatt att temperaturen håller sig över minus 10 grader. Likaså innan lövsprickning.
Cotoneaster	Buske med städsegrönt bladverk på långa, styva grenar, platt efter underlaget eller upp till någon meter högt.	Spontanetablerade exemplar klarar det mesta vad gäller läge/jord/vattentillgång. Planterade ex gynnas av etableringsvattning och näringstillförsel årligen.	Beskärning behövs inte annat än för att ev hålla tillväxten nere på vissa platser. Tål hård beskärning. Bör behållas för att de klarar omöjlig förhållanden. Räknas dock nu till invasiva växter enl Länsstyrelsens lista, och ska inte nyplanteras.
Ek	Kraftiga träd upp till 15 m. Stormfasta, bl a pga pålrot som förstärker övrigt rotsystem Kan bli mycket gamla. Hyser ett mycket stort antal olika arter av allt från insekter till fåglar.	Inte aktuellt	Gallra bort döda grenar om de utgör fara. Observera att grenen ska skäras strax utanför den valk nära stammen som kallas grenkrage och bidrar till god läkning.
En	Smalt och upprätt pelarformat växtsätt med små gröna barr med skimrande silver på undersidan, gröna även på vintern. Den en som växer naturligt i området kan bli några meter hög.	Inte aktuellt.	Döda grenar skärs intill stam eller i grenvinkel där det passar. Lämna gärna även exemplar som inte är helt ok - värdefullt naturvårdsträd.
Fläder	Snabbväxande och tålig, brett upprättväxande buske. Kan även få växa till trädform. Mycket fin och doftande blomning. Både blommor och bär kan användas till saft och sylt. Observera att detta gäller just Sambucus nigra, med svarta bär. Sambucus racemosa, druvfläder, med klasar av röda bär, är giftig. Fläder drabbas nästan alltid av rejäla mängder bladlöss.	Knappast aktuellt i vårt område. Annars som vanligt etableringsbevattning och naturgödsel/höns gödsel under våren.	Tål att beskäras kraftigt, ner till 50 cm. Juli till september eller vårvintern. Växer annars upp till trädformat, och om man vill kan man stamma upp det till ett träd. Alternativt kan man ta bort äldre grenar efterhand., nära stam eller botten så växtens karaktär bibehålls.
Idegran	Barrväxt med glansiga, mörkgröna och mjuka barr. Idegran är enkönad, och endast honplantor utvecklar giftiga röda frukter.	Naturgödsel. Som för all nyplantering gäller etableringsbevattning.	Om det är nödvändigt tål den hård beskärning i motsats till de flesta barrväxter. Kan formklippas.

Namn	Beskrivning	Näring och vatten	Beskärning
Kaprifol	Blommorna sitter i klasor och blommor i början av sommaren maj-juni. Våldoftande, särskilt kvällstid.	Tål inte uttorkning, speciellt inte de första åren. Gödsla med fullgödsel eller naturgödsel på våren, och komplettera gärna en gång på försommaren	Obeskurna plantor blir glesa och risiga. Beskärning rekommenderas med några års mellanrum några decimeter från marken så att plantan förnygras rejält. Detta görs tidigt på våren. I övrigt kan de äldsta och grövsta grenarna tas bort efterhand.
Körsbärsträd	Mindre träd med vacker försommarblomning som drar pollinerare. Vacker glänsande stam.	Näringsrik trädgårdsjord och rejäl vattning under etablering. Gärna trädgårdsgödning under våren.	Beskärning under juli -september, inte innan. Tål inte kraftig beskärning. Använd alltid vassa och rena verktyg - körsbär är känsligt för smittsamma sjukdomar.
Lagerhägg	Vackert vintergrön buske med sluthöjd 1,5-2,5 m, och knappt så bred. Kompakt, med något glansiga blad. Blommor med vita blommor i maj-juni. Blommor och bär uppskattas av pollinatörer och fåglar. Bären är inte ätliga.	Trädgårdsgödsel. Etableringsbevattning som vanligt. Ogillar alltför blöta lägen.	Kan få utvecklas fritt om utrymme finns. Annars kan äldre grenar skäras ur efterhand. Har vårskadade/utvintringsskador uppstått med torra partier som följd, kan man också beskära kraftigt. De kan stammas upp eller beskäras till häck. Akutbeskärning efter behov, normalt annars juli till september.
Lönn	Stort träd, skir blomning i maj, pollinerarvänlig.. Upp till 20 meter högt.	Nyetablerade exemplar mår väl av god vattning, näringstillskott och öppen jord i kron diameter.	Man bör undvika att beskära lönn. Om det måste göras gäller senhöst eftersom lönnar blöder (se lönn sirap).
Oxel	Medelstort träd, solitär, beskuren häck. Vita blommor i maj/juni.. Orangeröda bär på hösten, ludna blad med silverbaksida. Gillas av fåglar. Salttåligt.	Nyetablerad exemplar mår väl av god vattning, näringstillskott och öppen jord i kron diameter.	Oxel bör där det finns plats tillåtas att vara friväxande. Om nödvändigt, är det JAS-månaderna eller senvintern som gäller. Sträva efter att behålla trädets form.
Rönn	Medelstort dekorativt träd med röda bär som gillas av fåglar, och fin höstfärg. Solitärträd. Rönnbär är en viktig vinterföda för bl a koltrast.	Lägg gärna gräsklipp på ytan runt stamen. . Håller på fukt och bryts ner till näring.	Bör få utvecklas fritt.
Tall	Stort barrträd. Kan bli mycket gammalt och blir då värd för ett antal svamp- och insektsarter.	Klarar de flesta förhållanden, har djup pålrot som med övriga rötter gör trädet stormfast även i utsatta lägen så länge de har sina omkringstående träd intakta.	Tall börjar ofta läka runt torra grenar innan dessa släpps. Vanligen ingen beskärning. Flera tallar i området har utsatts för snöbrott under januari 2023, och har måst beskäras. Pga svårtillgänglighet har snitten inte alltid kunnat läggas optimalt snyggt nära stam och grenar.